



Laboratorio Weizur Argentina S.A.
Calle 474 (ex Pellegrini) N°87
B1896OLA - City Bell
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 221 4800010

FICHA TÉCNICA BUTROFINA

Formulario: DCN-F-GC15
Procedimiento: DTN-POE-GC08
N° Revisión: 01
Fecha de rev.: 10/12/2013
Página 1 de 1

PRODUCTO:

BUTROFINA

FECHA DE EMISION: ENERO 2014

Características

Medicamento para el aparato reproductor y maneje de la reproducción, hormonal, gonadorrelina

Descripción

Solución inyectable estéril. Hormona liberadora de las gonadotrofinas FSH y LH

Especies a las que se destina

Bovina y equina

Componentes

Acetato de Buserelina 0,0042 mg
Agentes de formulación c.s.p. 1,0 ml

Indicaciones

- *Vacas*: trastorno de la fertilidad de origen ovárico, específicamente: quistes foliculares, aciclia, ovulación retardada, atresia folicular. Incremento del índice de concepción en la inseminación artificial y también tras la sincronización del celo.
- *Yeguas*: trastornos quísticos de los ovarios acompañados o no de celo prolongado o permanente. Inducción de la ovulación: para fijar el tiempo de la ovulación y la monta; para mejorar el índice de concepción en celo prolongado o permanente.

Vías de administración

Intramuscular, también puede administrarse por vía endovenosa o subcutánea.

Dosificación

Dosis del producto en aplicación preventiva o curativa por peso vivo según especies o edades. Las dosis indicadas, se expresan en ml del producto terminado, dado que la cantidad en mg de buserelina es muy pequeña y puede prestarse a confusiones.

Cada ml del producto final contiene 0,004 mg de buserelina.

• *Vacas*:

Trastornos de la fertilidad de origen ovárico, especialmente:

- Quistes foliculares, aciclia, anestro: 5 ml
- Ovulación retardada, atresia folicular: 2,5 ml
- Incremento del índice de concepción en la IA y tras la sincronización del celo: 2,5 ml

• *Yeguas*:

- Trastornos quísticos de ovario con o sin celo prolongado o permanente: 10 ml
- Aciclia: 2 veces 5 ml a intervalo de 24 horas
- Inducción de la ovulación: 10 ml
- Fijar el tiempo de ovulación y monta: 10 ml
- Mejora del índice de concepción: 10 ml
- Celos prolongados o permanentes: 10 ml

Contraindicaciones

No presenta contraindicaciones ni limitaciones de uso.



Laboratorio Weizur Argentina S.A.
Calle 474 (ex Pellegrini) N°87
B1896OLA - City Bell
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 221 4800010

FICHA TÉCNICA BUTROFINA

Formulario: **DCN-F-GC15**
Procedimiento: DTN-POE-GC08
N° Revisión: 01
Fecha de rev.: 10/12/2013
Página 2 de 2

Restricciones

No tiene período de restricción para el sacrificio del animal o para la leche destinada al consumo humano

Vencimiento (período de validez)

2 años a partir de la fecha de elaboración.

Presentación

Frascos por 10 y por 50 ml