



Laboratorio Weizur Argentina S.A.
Calle 474 (ex Pellegrini) N°87
B1896OLA - City Bell
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 221 4800010

FICHA TÉCNICA CONTRACTYL

Formulario: DCN-F-GC15
Procedimiento: DTN-POE-GC08
N° Revisión: 01
Fecha de rev.: 10/12/2013
Página 1 de 1

PRODUCTO:

CONTRACTYL

FECHA DE EMISION: FEBRERO 2014

Características

Medicamento para el aparato reproductor y manejo de la reproducción, hormona hipofisiaria.

Descripción

La oxitocina actúa sobre la musculatura del útero estimulando las contracciones uterinas y de la glándula mamaria permitiendo la bajada de la leche.

Componentes

Oxitocina sintética 10 UI/ ml

Especies a las que se destina

Bovina, equina, porcina, ovina, caprina, canina y felina

Indicaciones de uso

Inducción al parto, inercia o atonía uterina, involución del útero tras cesáreas, expulsión de placenta y restos de exudados tras el parto, iniciación a la lactación tras el parto promoviendo la bajada de la leche, piometritis y endometritis crónicas para provocar la expulsión de exudados, tratamiento coadyuvante de la terapia antibiótica de la mastitis aguda y crónica, para provocar la expulsión de residuos y facilitar el drenaje y en la agalaxia de la cerda.

Vías y formas de administración

Vía intramuscular o subcutánea. Cuando se requiere un efecto muy rápido inyectar un cuarto de la dosis recomendada por vía endovenosa, diluida 1:10 con agua para inyección.

Dosificación

- Yeguas y vacas: 5-10 ml (obstetricia), 1-2 ml (eyección láctea).
- Cerdas: de hasta 200 kg 2-3 ml (obstetricia), 1,5 ml (eyección láctea), de más de 200 kg dosis proporcionales.
- Ovejas y cabras: 3-5 ml (obstetricia), 0,5-2 ml (eyección láctea).
- Perras: 0,5-2 (obstetricia), 0,2-1 ml (eyección láctea).
- Gatas: 0,25-0,5 ml (obstetricia), 0,25 ml (eyección láctea).

Intervalo entre dosis

El tratamiento se administra una sola vez, en caso necesario repetir la administración de dosis que no superen $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ de la dosis indicada, hasta la obtención de resultado esperado.

Contraindicaciones y Precauciones

No exceder las dosis indicadas, en caso necesario repetir la administración de dosis que no superen $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ de la dosis indicada, hasta la obtención del resultado esperado. No administrar en casos de:

- Hipersensibilidad al medicamento.
- Distocias por presentación anormal, desproporción pélvico-fetal o cualquier tipo de obstrucción mecánica.
- Enfermedades cardiovasculares.
- Hembras con predisposición a ruptura uterina.

No aplicar el producto en caso de distocia o presentación anormal de feto.



Laboratorio Weizur Argentina S.A.
Calle 474 (ex Pellegrini) N°87
B1896OLA - City Bell
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 221 4800010

FICHA TÉCNICA CONTRACTYL

Formulario: DCN-F-GC15
Procedimiento: DTN-POE-GC08
N° Revisión: 01
Fecha de rev.: 10/12/2013
Página 2 de 2

Margen de seguridad

La oxitocina sintética es idéntica a la oxitocina natural, tanto química como fisiológicamente, por lo tanto no es un metabolito extraño al organismo de los mamíferos y su utilización no conlleva ningún tipo de toxicidad ni problemas de tolerancia.

Por ello se omiten las pruebas de toxicidad única y reiterada, así como los ensayos de tolerancia en los animales de destino.

Se trata de un producto poco tóxico. No se ha fijado la DL50, sin embargo, podemos citar a Manuel Litter FARMACOLOGÍA, quien indica: "La oxitocina, fuera de los accidentes de la asfixia fetal y la ruptura uterina, comunes a todos los oxitócicos importantes, no da lugar de por sí a reacciones adversas, sobre todo si se la emplea por fleboclisis lenta y a pequeñas dosis."

Calidad del producto

Causas que hacen variar la calidad: La temperatura fuera del rango estipulado y la luz solar directa.
Conservación correcta: En su envase original, a una temperatura de entre 5 y 25 °C

Vencimiento (período de validez)

2 años a partir de su fecha de elaboración.

Presentación

Frasco x 50 ml.