



Laboratorio Weizur Argentina S.A.
Calle 474 (ex Pellegrini) N°87
B1896OLA - City Bell
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 221 4800010

FICHA TÉCNICA CUPRIXIN

Formulario: DCN-F-GC15

Procedimiento: DTN-POE-GC08

N° Revisión: 01

Fecha de rev.: 10/12/2013

Página 1 de 3

PRODUCTO:

CUPRIXIN

FECHA DE EMISION: JULIO 2018

Características

Suplemento mineral para cubrir deficiencias de cobre.

Descripción

Solución acuosa inyectable.

Especies a las que se destina

Bovinos

Componentes

Edetato cúprico disódico* 9,40 g

Excipientes c.s.p. 100 ml

* Equivale a 15 mg/ml de cobre metálico/activo

Propiedades

Cuprixin es un suplemento mineral para cubrir deficiencias de cobre.

Está indicado para el tratamiento de estados carenciales de COBRE y de los trastornos derivados de la Hipocuprosis(*): Anemia hipocrómica y macrocítica. Deformaciones óseas: alteración de la deposición de los minerales en la matriz cartilaginosa lo que conduce a fragilidad de los huesos con fracturas espontáneas, encorvamiento del espinazo, incoordinación de los movimientos de extremidades posteriores, marcha envarada y vacilante, "tambaleo", debilidad del tercio posterior y elevada mortalidad. Fibrosis del miocardio: atrofia del miocardio con fibrosis y muerte súbita ("caída") en los arreos. Diarreas inespecíficas y persistentes que responden a la suplementación con cobre. Disminución de la fertilidad: con alteración del celo, menor número de pariciones, abortos, esterilidad. Alteración del apetito: pérdida del apetito y pérdida de peso. Alteración del desarrollo: disminuido en animales jóvenes especialmente. Disminución de la producción láctea. Menor resistencia a enfermedades infecciosas.

Alteraciones del pelaje: la "acromotriquia" o despigmentación del pelo es la manifestación más precoz y sensible de la deficiencia de cobre. La despigmentación se inicia con la formación de pelo blanco-grisáceo en los animales de pelaje negro y castaño-claro en animales de pelaje colorado, especialmente alrededor de los ojos. Queratinización insuficiente: aparición de pelo rígido y delgado con pérdida de elasticidad y resistencia a la tracción.

(*)Hipocuprosis: cabe aclarar que en nuestro territorio se trata de un hipocuprosis "condicionada" por la elevada ingesta de Molibdeno y Sulfatos inorgánicos, que reducen la absorción y biodisponibilidad del cobre ingerido, aún cuando los niveles del mismo en los alimentos es normal.

Indicaciones de uso

La aplicación y determinación de la dosis adecuada (según peso y estado sanitario del animal) debe ser bajo estricta supervisión del profesional veterinario.

Vías y formas de administración

- *Bovinos*: subcutánea



Laboratorio Weizur Argentina S.A.
Calle 474 (ex Pellegrini) N°87
B1896OLA - City Bell
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 221 4800010

FICHA TÉCNICA CUPRIXIN

Formulario: DCN-F-GC15

Procedimiento: DTN-POE-GC08

N° Revisión: 01

Fecha de rev.: 10/12/2013

Página 2 de 3

Dosificación/ Intervalo entre dosis

Bovinos hasta 200 kpv 1,0 cc/50 kpv
Novillos y vaquillonas 4,0 cc como dosis única
Vacas 5,0 cc como dosis única
Toros 6,0 cc como dosis única

Duración del tratamiento

El tratamiento puede repetirse cada 60 días, siendo suficiente, en casos de hipocuprosis leve una aplicación cada 90 días o más. La frecuencia de aplicación podrá modificarse según criterio del profesional veterinario actuante. Cuando las dosis superen los 4 ml se recomienda repartirla en dos puntos de inoculación.

Contraindicaciones

No administrar tratamientos paralelos con otros suplementos de cobre por ninguna vía de administración. La sobredosificación con cobre por cualquier vía de administración puede provocar intoxicación fatal. No administrar otros fármacos en forma paralela cuya compatibilidad no esté explicitada en el prospecto/rótulo, dentro de las 48 hs anteriores o posteriores al tratamiento con este producto.

Se sugiere no administrar el producto dentro de los 30 días posteriores a la última vacunación de los animales con cualquier tipo y origen de vacuna o prueba de tuberculinización. Se deberá tener atención en el ganado lechero debido a la sensibilidad genética de esta raza.

A las dosis sugeridas se produce un pequeño bulto en el punto de aplicación que desaparece en 1 a 2 semanas o antes no representando ningún riesgo para la salud del animal.

Precauciones

Verifique la integridad del envase y precinto. Se deberán observar estrictas normas de seguridad y asepsia durante la aplicación. Administrar exclusivamente por vía subcutánea para asegurar su máxima biodisponibilidad y liberación prolongada (efecto Depot). Mantener fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas para su uso.

Se aconseja asegurar un diagnóstico correcto de la hipocuprosis basado en la sintomatología clínica, características del terreno, alimentación y determinaciones bioquímicas (cobre plasmático, ceruloplasmina o citocromo-oxidasa). De ser posible confirmar el diagnóstico mediante la respuesta al tratamiento de "toque". En terneros de menos de 6 meses se recomienda hacer una determinación de cobre plasmático.

Evitar procedimientos fuertemente estresantes (transporte, castración, descorne) dentro de las 48 hs anteriores o posteriores al tratamiento.

Utilizarse con precaución en animales muy debilitados o enfermos.

Cuidar el medio ambiente: los envases de polipropileno deben disponerse para su recolección en bolsas (conteniendo solo envases), para su disposición final o reciclado.

En casos de intoxicación aguda se deberá suspender la aplicación del producto inmediatamente. Los animales afectados deberán ser tratados sintomáticamente mediante el suministro de corticoides, antihistamínicos, broncodilatadores, etc., según criterio del profesional actuante.

CUPRIXIN debe utilizarse bajo la supervisión de un Profesional Veterinario para asegurar su correcto empleo. El laboratorio no se hace responsable del uso inadecuado de este producto.

Período de Retiro

Carne: Suspender el tratamiento a partir de los 30 días anteriores al envío de los animales a la faena para consumo humano.

Leche: No destinar la leche proveniente de animales tratados a consumo humano o a la industria hasta transcurridos 30 días de la última aplicación. No administrar a animales en producción láctea.



Laboratorio Weizur Argentina S.A.
Calle 474 (ex Pellegrini) N°87
B1896OLA - City Bell
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 221 4800010

FICHA TÉCNICA CUPRIXIN

Formulario: **DCN-F-GC15**

Procedimiento: DTN-POE-GC08

N° Revisión: 01

Fecha de rev.: 10/12/2013

Página 3 de 3

Conservación:

El producto debe almacenarse en sitio fresco, higiénico, al abrigo de la luz. Debe conservarse en su envase original entre 4° y 35°C.

Vencimiento (período de validez)

2 años a partir de la fecha de elaboración

Presentación

Frascos por 50, 100, 250 y 500 ml, ml.