



Enfloxazur

Antimicrobiano, quimioterápico, quinolona

Descripción

Antibiótico bactericida

Especies a las que está destinado

Bovina, ovina, caprina, porcina, felina y canina

Componentes y propiedades

Enrofloxacin al 10 % p/v. Antibiótico bactericida de la familia de las quinolonas y su actividad antimicrobiana está basada en la inhibición de la topo-isomerasa bacteriana, también conocida como ADN – Girasa. Esta enzima es la encargada de dirigir la dirección y la extensión de los espirales de las cadenas de ADN.

Enfloxazur Plus al unirse a la ADN – Girasa, inactiva a esta última e impide el enrollamiento de la hélice de ADN de las bacterias y, por lo tanto, impide su desarrollo celular provocando la muerte de la bacteria.

Indicaciones

Enfloxazur Plus está indicado en el tratamiento y control de infecciones dérmicas, respiratorias, urinarias e intestinales, producidas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos; como *Escherichia Coli*, *Pasteurella* sp, *Klebsiella* sp, *Salmonella* sp, *Staphilococcus* sp, *Streptococcus* sp, *proteus* sp, *Listeria monocytogenes*, *Bacteroides* sp, *Clostridium* sp, *Actinobacillus* sp, *Brucella* sp, *Leptospira* sp, *Rickettsia* sp, *Haemophilus Sommus*.

Dosificación y vías de administración

- Bovinos, caprinos y ovinos: 0,05 ml por kilogramo de peso, cada 24 horas por vía subcutánea.
- Porcinos: 0,05 ml por kilogramo de peso, cada 24 horas por vía intramuscular profunda.
- Caninos y felinos: 0,025 ml por kilogramo de peso, cada 12 horas por vía subcutánea.

Contraindicaciones

- Carne: entre la última aplicación y la faena deben transcurrir 7 días.
- Leche: *Se recomienda no administrar a vacas en producción de leche para consumo humano.*

Vencimiento (período de validez)

18 meses a partir de la fecha de elaboración

Presentación

Frasco por 100 ml

Certificado SENASA Nro. 06-190

Nomenclatura Común Mercosur (NCM): 3004.90.67