



Estrepto-Pen Plus

Antimicrobiano, antibiótico, β -Lactámico, penicilánico, aminoglucósico, antiinflamatorio no esteroide

Descripción

Suspensión oleosa inyectable

Especies a las que está destinado

Bovina, equina, ovina y porcina

Componentes

Cada 100 ml contiene:

Penicilina G procaína	20.000.000 UI
Agentes de formulación c.s.p.	100,00 ml

Indicaciones de uso

Estrepto-Pen Plus está indicado para el tratamiento de las siguientes afecciones:

- **Bovinos:** mastitis causada por *Streptococcus spp* y *Streptococcus pyogenes*, procesos biogénicos, edema maligno, carbunclo sintomático, enteroxemia, gangrena, homoglobinuria, tétano.
- **Equinos:** infecciones causadas por *Streptococcus equi*, infección de los recién nacidos, onfaloflebitis, artritis supurativas, *Actinobacillus spp*, *Salmonella*, linfangitis ulcerativa, neumonía de los potrillos, tétano.
- **Ovinos:** artritis infecciosa de los corderos, poli artritis de los corderos, endocarditis, linfadenitis caseosa de los ovinos, tétano, edema maligno, actinobacilosis.
- **Porcinos:** artritis de los lechones, poliartrosis, cistitis y pielonefritis de los cerdos, listeriosis, carbunclo, tétano post castración, edema maligno.

Vías y formas de administración

Administrar por vía intramuscular profunda. En el caso del tratamiento del carbunclo sintomático, la aplicación deberá hacerse por vía endovenosa.

No aplicar más de 15 ml por lugar de aplicación.

Dosificación

Dosis del producto en aplicación preventiva o curativa por peso vivo según especies o edades.

- **Bovinos y equinos:**
1 cm³/20 kpv (kilogramo de peso vivo), lo que corresponde a 10.000 UI de Penicilina G Procaína, 4 mg de Sulfato de Dihidroestreptomicina y 0,3 mg de Piroxicam por kpv.
- **Ovinos y porcinos:**
2 cm³/10 kpv, lo que corresponde a 40.000 UI de Penicilina G Procaínica, 16 mg de Sulfato de Dihidroestreptomicina y 1,2 mg de piroxicam por kpv

Intervalo entre dosis

Aplicar cada 72 horas

Duración del tratamiento

Una semana

Contraindicaciones

Estrepto-Pen Plus no debe ser aplicado a aquellos animales que demuestren antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas o a animales que hayan demostrado tener hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico u otras sustancias antiinflamatorias no esteroideas.



Estrepto-Pen Plus

**Antimicrobiano, antibiótico, β -Lactámico, penicilánico,
aminoglucósico, antiinflamatorio no esteroide**

No utilizar en animales con nefropatías graves, debido a los efectos neurotóxicos de la dihidroestreptomicina.

Evitar su uso durante la gestación y lactancia.

Vencimiento (período de validez)

2 años a partir de su fecha de elaboración.

Presentación

Frasco por 25 ml

Certificado SENASA Nro. 07-012

Nomenclatura Común Mercosur (NCM): 3004.10.15