



Laboratorio Weizur Argentina S.A.
Calle 474 (ex Pellegrini) N°87
B1896OLA - City Bell
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 221 4800010

FICHA TÉCNICA FLUMEXINE

Formulario: DCN-F-GC15
Procedimiento: DTN-POE-GC08
N° Revisión: 01
Fecha de rev.: 10/12/2013
Página 1 de 1

PRODUCTO:

FLUMEXINE

FECHA DE EMISION: ENERO 2014

Características

Antiinflamatorio no esteroide

Descripción

Solución acuosa inyectable

Especies a las que se destina

Bovina, equina y porcina

Componentes

Flunixin 5g
Excipientes c.s.p. 100ml

El flunixin es una droga antiinflamatoria no esteroide (NSAID) y un analgésico no narcótico con actividad antipirética.

Flunixin actúa como potente inhibidor del sistema de la enzima ciclooxigenasa implicado en el mecanismo de la inflamación, la consecuente disminución en la producción de distintos mediadores de la inflamación explicaría sus propiedades antiinflamatorias, antipiréticas y analgésicas.

Indicaciones de uso

- Bovinos: Tratamiento de la inflamación aguda asociada a enfermedades del tracto respiratorio.
- Equinos: tratamiento de dolores viscerales asociados al cólico. Tratamiento de inflamaciones y dolores asociados a alteraciones músculo esqueléticas.
- Porcinos: tratamiento de la inflamación aguda asociada a artritis, astitas y síndrome MMA.

Vías y formas de administración

- Bovinos: endovenosa o intramuscular.
- Equinos: intramuscular o endovenosa lenta, especialmente en casos de síndrome cólico, para aliviar el dolor en forma rápida.
- Porcinos: intramuscular.

Dosificación

- *Equinos*: 1,1 mg/kg de peso
- *Bovinos y Porcinos*: 1,1 - 2,2 mg/kg

Dosis del producto en aplicación preventiva o curativa por peso vivo según especies o edades.

- *Equinos*: 1 ml/45 kg de peso/24 horas
- *Bovinos y porcinos*: 1 - 2 ml/45 kg de peso

Intervalo entre dosis

- *Equinos*: 24 horas para desórdenes músculo-esqueléticos.
- *Bovinos*: Las dosis puede dividirse por la mitad y aplicarse 2 veces al día con intervalos de 12 h o la dosis total en aplicación única con intervalo entre dosis de 24 h
- *Porcinos*: 12 horas.



Laboratorio Weizur Argentina S.A.
Calle 474 (ex Pellegrini) N°87
B1896OLA - City Bell
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 221 4800010

FICHA TÉCNICA FLUMEXINE

Formulario: **DCN-F-GC15**
Procedimiento: DTN-POE-GC08
N° Revisión: 01
Fecha de rev.: 10/12/2013
Página 2 de 2

Duración del tratamiento

- *Equinos*: 5 días
- *Bovinos*: 3 días
- *Porcinos*: 3 días

Contraindicaciones

No administrar a sujetos con antecedentes de alergia a meglumina de flunixin.
No administrar a yeguas gestantes, animales de menos de tres días de edad, caballos con historial de hipersensibilidad al flunixin, caballos de carreras en los ocho días previos a una competición.

Precauciones

Inyectar con técnica antiséptica.
Inyectar lentamente.
Evitar la inyección intra-arterial en equinos.

Vencimiento (período de validez)

2 años a partir de la fecha de elaboración

Presentación

Frascos por 20 y 250ml