

Descripción

Solución inyectable estéril.

Especies a las que está destinado:

Bovina

Componentes y propiedades

Cada 100 ml contiene:

Gluconato de calcio	15,00 g % p/v
Hipofosfito de magnesio	5,00 g % p/v
Cloruro de magnesio	3,00 g % p/v
Cloruro de potasio	0,26 g % p/v
Cloruro de sodio	0,85 g % p/v
Glucosa	20,00 g % p/v
Difenhidramina clorhidrato	0,05 g % p/v
Acido bórico	2,18 g % p/v
Agua destilada c.s.p.	100,00 ml

Indicaciones

Hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, tetania y acetonemia.

No tiene actividad antimicrobiana ni antiparasitaria.

Vía de administración

Endovenosa lenta. Puede complementarse con la subcutánea para lograr un efecto más prolongado.

Dosificación

Dosis del producto en aplicación preventiva o curativa por peso vivo según especies o edades, es de 500 a 1.000 ml dependiendo del caso clínico y del criterio del profesional actuante.

En bovinos la dosis aproximadamente es: Calcio (Ca) 1 g/ 50 kg de peso y pueden ser óptimos 12 g totales de calcio y Magnesio (Mg) 0,7- 1,5 g/ 50 kg de peso.

La dosis indicada de 500 a 1.000 ml de producto proveen aproximadamente las cantidades indicadas de Ca y Mg.

Las dosis pueden repetirse cada 6 – 8 horas o intervalos mayores, conforme al criterio del profesional actuante.

Intervalo entre dosis

Se puede repetir cada 6 a 8 horas o con intervalos mayores.

Duración del tratamiento

El tratamiento puede extenderse hasta la remisión de los síntomas.

Contraindicaciones

La administración rápida por vía endovenosa puede dar lugar a efectos indeseables.

Vencimiento (período de validez)

2 años a partir de su fecha de elaboración.



Glucomag

Mineralizante – energizante

Presentación

Frasco conteniendo 500 ml

Certificado SENASA Nro. 07-200

Nomenclatura Común Mercosur (NCM):