



IverZur

Antiparasitario endectocida

Descripción

Solución inyectable

Especies a las que está destinado

Bovina

Componentes

Ivermectina	1,00 g
Agentes de formulación c.s.p.	100,00 ml

Indicaciones de uso

Para el tratamiento y control de parásitos internos y externos.

- Parásitos gastrointestinales (estadios inmaduros y adultos): *Ostertagia ostertagi*, *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus placi*, *Trichostrongylus axei*, *T. Columbriformis*, *Cooperia oncophora*, *C. pectinata*, *C. Punctata*, *Cooperia spp.* (inmaduros), *Nematodirus helvetianus* (adultos), *N. spathiger* (adultos), *Strongyloides papillus*, *Bunostomun phlebotomun*, *Toxocara vitulorum* (adultos), *Oesophagostomun radiatum*, *Paramphistomun spp.*
- Parásitos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus* (adultos, inmaduros y estadios inhibidos).
- Parásitos externos
 - Sarna: colabora en el control de *Psoroptes ovis* (var. *bovis*) sinónimo *Psoroptes communis* var. *bovis*
 - Miasis cutánea: *Hypoderma lineatum*, *Hypoderma bovis*
 - Piojos: *Lignonathus vituli*, *Haemotopinus eurysternus*, *Solenoptes capillatus*
 - Ura: *Dematobia hominis*
 - Miasis: *Cchiomyia hominivorax* como preventivo

Vías y formas de administración

Vía subcutánea

Dosificación

La dosis es de 1 ml por cada 50 kg de peso vivo. Aplicación única.

Precauciones

No administrar por vía endovenosa o intramuscular

No administrar a animales con estado febril, estresados o muy debilitados

No administrar a vacas dentro de los 28 días previos al parto

Restricciones

No sacrificar animales para consumo humano hasta que hayan transcurridos 35 días desde el último tratamiento

No administrar a vacas en lactancia, cuando la leche se destine a consumo humano

Vencimiento (período de validez)

2 años a partir de su fecha de elaboración.

Presentación

Frasco conteniendo 50 y 500 ml

Certificado SENASA Nro. 0404/E

Nomenclatura Común Mercosur (NCM): 3004.90.99