



Laboratorio Weizur Argentina S.A.
Calle 474 (ex Pellegrini) N°87
B1896OLA - City Bell
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 221 4800010

FICHA TÉCNICA LIVERZUR

Formulario: DCN-F-GC15

Procedimiento: DTN-POE-GC08

N° Revisión: 01

Fecha de rev.: 10/12/2013

Página 1 de 2

PRODUCTO:

LIVERZUR

FECHA DE EMISION: JULIO 2018

Características

Regenerador y protector del parénquima y funcionamiento hepático.

Descripción

Solución acuosa inyectable.

Especies a las que se destina

Bovinos, ovinos, caprinos, camelidos, porcinos, equinos de todas las edades y categorías.

Componentes

Sorbitol	22.00 g
DL Metionina	4.00 g
Tiamina HCl	0.50 g
Excipientes c.s.p	100.00 ml.

Propiedades

- Principales:

Tratamiento de alteraciones hepáticas de cualquier origen: infecciones bacterianas, víricas, parasitarias (distomatosis anaplasmosis), metabólicas (cetosis acetoneemia), tóxicas o desbalances nutricionales.

- Complementarias:

Recupera al animal de los excesos y desbalances nutricionales por modificaciones en la ración, exceso de proteínas (edema de ubre), déficit de energía (hígado graso, cetosis), alteración en el metabolismo de los carbohidratos. Estabiliza y desintoxica el sistema hepato-pancreático, devolviendo al animal su condición productiva.

Indicaciones de uso

Liverzur es un inyectable listo para su uso. Se aplica por vía intramuscular profunda o vía endovenosa lenta, debiendo seguirse las normas elementales de seguridad y asepsia en la aplicación de este producto.

Vías y formas de administración

vía intramuscular profunda o vía endovenosa lenta

Dosificación

Dosis preventiva: 30ml máximo

Bovinos y Camélidos: 2.5 ml cada 10 kilos de peso vivo

Ovinos y Caprinos: 0.6 ml cada 10 kilos de peso vivo

Porcinos y Equinos: 2.5 ml cada 10 kilos de peso vivo

Terapéutica:

Bovinos y Equinos 25ml/100kpv.

Porcinos, Ovino y Caprinos: 2,5ml/10kpv



Laboratorio Weizur Argentina S.A.
Calle 474 (ex Pellegrini) N°87
B1896OLA - City Bell
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 221 4800010

FICHA TÉCNICA LIVERZUR

Formulario: **DCN-F-GC15**

Procedimiento: DTN-POE-GC08

N° Revisión: 01

Fecha de rev.: 10/12/2013

Página 2 de 2

Intervalo entre dosis

Todas las especies: Las dosis indicadas podrán repetirse cada 24 hs hasta la recuperación del animal.

Duración del tratamiento

Continuar el tratamiento hasta desaparición de los síntomas.

Contraindicaciones

No posee a las dosis recomendadas. Una salvedad son animales hipersensibles a alguno de sus ingredientes.

No posee incompatibilidades farmacológicas.

No posee antagonismos farmacológicos.

Precauciones

Debe agitarse el producto previo a la aplicación y deberán respetarse todas las normas correspondientes a una correcta inoculación subcutánea

Período de Retiro

No posee.

Conservación:

El producto debe ser conservado en su envase original cerrado en un lugar fuera del alcance de los niños, bajo llave, seco, higiénico y al abrigo de la luz solar directa, a una temperatura no menor de los 5º C y no mayor a los 30º C.

Vencimiento (período de validez)

2 años a partir de la fecha de elaboración

Presentación

Frascos por 100, 250 y 500 ml.