Laboratorio Weizur Argentina S.A.
Calle 474 (ex Pellegrini) N°87
B1896OLA - City Bell
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 221 4800010

FICHA TÉCNICA
MASTIZUR CL

PRODUCTO:	**MASTIZUR CL**

FECHA DE EMISION: ENERO 2014

Características

Antimicrobiano – antibiótico – betalactámico - penicilínico

Descripción

Suspensión intra mamaria para la curación y/o prevención de la mastitis

Componentes y propiedades

Cada 8 g contiene:

Amoxicilina	200,00 mg
Ácido Clavulánico	50,00 mg
Prednisolona	10,00 mg
Agentes de formulacion c.s.p	8,00 g

Mastizur CL es un producto a base de Amoxicilina, Ácido Clavulánico y Prednisolona.
La Amoxicilina, antibiótico β lactámico, previene la síntesis de la pared celular de los microorganismos Gram positivos, interfiriendo en la síntesis del peptidoglucano.
El Ácido Clavulánico tiene afinidad por β lactamasas de gérmenes Gram positivos y Gram negativos, por lo que impide que se combinen con el antibiótico β lactámico y lo destruyan. Ejerciendo una acción sinérgica.
La Prednisolona, es un corticoide y se usa para la reducción de las inflamaciones mamarias durante las mastitis clínicas.

Indicaciones de uso

Usada en el tratamiento de Mastitis Clínica de vacas en lactancia, causada por gérmenes patógenos y particularmente aquellos productores de Beta Lactamasas.

Vías y formas de administración

Vía intramamaria.

Dosificación

200 mg activos de amoxicilina trihidrato, 50 mg de clavulanato de potasio y 10 mg de prednisolona, equivalente a 8 g de producto, por cada cuarto mamario luego del último ordeño.

Duración del tratamiento

Dos aplicaciones con 12 hs. de intervalo, y una tercera aplicación 24 hs. después de esta última, o según indicación del Médico Veterinario actuante.

Contraindicaciones

El producto se encuentra contraindicado en Hipersensibilidad de tipo general (anafilaxia) o de tipo local (alergias) en animales con antecedentes de alergia a penicilinas o a los antibióticos β lactámicos.

Precauciones que deben adoptarse:

- ordeñar a fondo el cuarto mamario afectado.
- desinfectar la punta del pezón con una torunda de algodón embebida preferentemente en alcohol de 70º o en alcohol común.

- quitar el tapón protector de la jeringa evitando tocar la cánula intramamaria con los dedos.
- Hacer salir una gota del producto para lubricar.
- Introducir la cánula intramamaria en el conducto del pezón lo mínimo imprescindible para aplicar el producto.
- Inyectar totalmente el contenido de la jeringa.
- Masajear el pezón y la parte inferior de la ubre en forma ascendente.
- Sumergir el pezón en un baño antiséptico adecuado.

Precauciones

El producto no presenta toxicidad alguna administrado en forma correcta y a la dosis indicada.

El producto no presenta riesgos para la Salud Pública, Animal y Medio Ambiente.

Calidad del producto

Causas que hacen variar la calidad: La temperatura fuera del rango estipulado y la luz solar directa.

Conservación correcta: En su envase original, entre 5 y 25 ºC

Vencimiento (período de validez)

2 años a partir de la fecha de elaboración

Presentación

Inyectores intramamarios por 8 gr.