



# TiloZur

## Antimicrobiano - Antibiótico - Macrólido

### Descripción

Solución inyectable estéril.

### Componentes y propiedades

Tilosina tartrato (expresado como base)	20,00 g
Alcohol Bencílico	4,00 g
Solución acuosa Propilenglicol al 50 % c.s.p	100,00 g

### Especies animales a las que se destina

Bovina y porcina

### Indicaciones

Infecciones causadas por gérmenes sensibles. Pododermatitis, endometritis, bronconeumonía enzoótica porcina.

### Vía de administración

Por vía inyectable intramuscular profunda. La duración del tratamiento varía entre 1 y 5 días en bovinos y como máximo 3 días en porcinos.

### Dosificación

La dosis para bovinos y porcinos es de 15 a 30 mg de tilosina base por kg de peso, por día.

La dosis del producto en aplicación preventiva o curativa por peso vivo según especies o edades será de 1 ml cada 6,5 a 13,5 kg de peso vivo por día.

### Intervalo entre dosis

Repetir la dosificación cada 24 horas.

### Duración del tratamiento

La duración del tratamiento varía entre 1 y 5 días, dependiendo de la gravedad del caso y de la indicación del Médico Veterinario

### Vencimiento (período de validez)

2 años a partir de la fecha de elaboración.

### Presentación

Frasco por 100 ml y 250 ml

### Certificado SENASA Nro. 06-191

Nomenclatura Común Mercosur (NCM): 3004.20.29