



Laboratorio Weizur Argentina S.A.  
Calle 474 (ex Pellegrini) N°87  
B1896OLA - City Bell  
Pcia. de Buenos Aires - Argentina  
Tel/Fax: +54 221 4800010

## FICHA TÉCNICA ULTRASEAL

Formulario: DCN-F-GC15  
Procedimiento: DTN-POE-GC08  
N° Revisión: 01  
Fecha de rev.: 10/12/2013  
Página 1 de 2

PRODUCTO:

**ULTRASEAL**

FECHA DE EMISION: JUNIO 2015

### Características

Sellador intramamario

### Descripción

Suspensión intramamaria de subnitrato de bismuto para el sellado interno durante el periodo de secado.

### Componentes y propiedades

*Subnitrato de bismuto.* Es un agente astringente.

### Fórmula

Subnitrato de bismuto..... 65g  
Excipientes c.s.p..... 100 g

### Indicaciones de uso

Destinado al ganado bovino

Tratamiento al secado de las vacas lecheras para prevención de las mastitis causadas por bacterias. ULTRASEAL está indicado para la prevención de infecciones intramamarias en todo el período seco. Esto resulta en una reducción en la incidencia de mastitis subclínica en las vacas al momento del parto, y de Mastitis clínicas en el período seco y el posterior a la lactancia (por lo menos 60 días después del parto).

Se recomienda que ULTRASEAL sea utilizado como parte de un enfoque a manejo de la vaca seca y control de mastitis. Vacas con probabilidades de estar libre de mastitis subclínica debe administrarse ULTRASEAL de acuerdo con los criterios consignados a continuación.

### Dosificación

1 jeringa intramamaria, conteniendo 4 g de producto, aplicada a cada cuarto de la glándula mamaria al momento del secado.

### Intervalo entre dosis

No hay intervalo dado que el producto se aplica en dosis única luego del último ordeño de la lactancia

### Duración del tratamiento

Se aplica una dosis única

### Contraindicaciones

El producto es inocuo.



Laboratorio Weizur Argentina S.A.  
Calle 474 (ex Pellegrini) N°87  
B1896OLA - City Bell  
Pcia. de Buenos Aires - Argentina  
Tel/Fax: +54 221 4800010

## FICHA TÉCNICA ULTRASEAL

Formulario: **DCN-F-GC15**  
Procedimiento: DTN-POE-GC08  
N° Revisión: 01  
Fecha de rev.: 10/12/2013  
Página 2 de 2

### **Modo de empleo**

Previa a la administración del producto, lavar y secar cuidadosamente los pezones. Luego, desinfectar la punta del pezón con un algodón o gasa embebida en alcohol. Insertar la jeringa intramamaria en el canal del pezón e introducir todo el producto lentamente. No masajear, ya que el producto debe permanecer en la cisterna del pezón para ejercer su efecto.

### **Precauciones**

Conservar entre 5 y 25 °C.

Almacenar el producto en sus envases originales, en lugar fresco y al abrigo de la luz.

Los envases vacíos, no constituyen un factor de riesgo. Descartar completamente el envase luego de haber utilizado el contenido. No arrojar el envase a cursos de agua.

### **Vencimiento (período de validez)**

Dieciocho (18) meses a partir de la fecha de elaboración

### **Presentación**

Inyectores intramamarios por 4 gr.