



Laboratorio Weizur Argentina S.A.
Calle 474 (ex Pellegrini) N°87
B1896OLA - City Bell
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 221 4800010

FICHA TÉCNICA ZINCOR

Formulario: DCN-F-GC15

Procedimiento: DTN-POE-GC08

N° Revisión: 01

Fecha de rev.: 10/12/2013

Página 1 de 2

PRODUCTO:

ZINCOR

FECHA DE EMISION: JULIO 2018

Características

Suplemento preventivo, terapéutico mineral.

Descripción

Solución acuosa inyectable.

Especies a las que se destina

Bovinos, ovinos, caprinos, camelidos y porcinos.

Componentes

Gluconato de Magnesio	30.00 g
Gluconato de Calcio	15.00 g
Gluconato de Zinc	8.00 g
Acido D-Borogluconico	12.00 g
Acido Fénico	1.00 g
Agua bidestilada estéril csp	100.00 ml

Propiedades

ZINCOR es un suplemento preventivo, terapéutico mineral a base de Magnesio, Calcio y Zinc.

Indicaciones de uso

ZINCOR es un inyectable listo para su uso.

- Principales:
Prevención y tratamiento de la hipomagnesemia clínica y subclínica
Tratamiento de desbalances metabólicos por carencias nutricionales de magnesio y zinc.
- Complementarias:
Prevención y tratamiento del gabarro, grieta del pezón, llaga del prepucio y/o paraqueratosis.
Para reducir el periodo de adaptación en animales que ingresan a Feed Lot.
Previo al pastoreo de verdeos estacionales o bien perennes como el agropiro, pasturas subtropicales degradadas, con deficiencias de Magnesio y Zinc. Cuando se encuentran rebrotes verdes luego de lluvias.
Optimiza los procesos fermentativos y potencia la flora ruminal.

Vías y formas de administración

Se aplica por vía subcutánea, delante o detrás de la escápula, debiendo seguirse las normas elementales de seguridad y asepsia en la aplicación de este producto.

Dosificación

Bovinos:	Terapéutica:	7 cm ³ cada 100 Kg de peso vivo
	Preventiva:	5 cm ³ cada 100 Kg de peso vivo



Laboratorio Weizur Argentina S.A.
Calle 474 (ex Pellegrini) N°87
B1896OLA - City Bell
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 221 4800010

FICHA TÉCNICA ZINCOR

Formulario: DCN-F-GC15

Procedimiento: DTN-POE-GC08

N° Revisión: 01

Fecha de rev.: 10/12/2013

Página 2 de 2

Ovinos, Caprinos y Camélidos: Terapéutica: 0.7 cm³ cada 10 Kg de peso vivo
Preventiva: 0.5 cm³ cada 10 Kg de peso vivo

Porcinos: Terapéutica: 0.7 cm³ cada 10 Kg de peso vivo
Preventiva: 0.5 cm³ cada 10 Kg de peso vivo

Intervalo entre dosis

Todas las especies:

- Terapéutica: cada 10 días hasta remisión de síntomas y no más de 3 repeticiones, siguiendo con la dosis preventiva.
- Preventiva: cada 30 días
- Estratégica: Con el rebrote verde, al ingresar al Feed Lot, situaciones de estrés, al ingresar en pasturas deficientes en magnesio y/o zinc.

Duración del tratamiento

Hasta remisión de los síntomas de deficiencia, de Magnesio ó Zinc.

Todas las especies: Terapéutico no más de 30 días

Preventivo o estratégica: dependiendo de la evolución del rodeo y según criterio del profesional actuante.

Contraindicaciones

No posee contraindicaciones a la dosis recomendada.

No posee incompatibilidades farmacológicas

No posee antagonismos farmacológicos.

Precauciones

Aplicar únicamente de manera subcutánea delante o detrás de la escápula.

Período de Retiro

No posee.

Conservación:

El producto debe ser conservado en su envase original cerrado en un lugar fuera del alcance de los niños, bajo llave, seco, higiénico y al abrigo de la luz solar directa, a una temperatura no menor de los 5º C y no mayor a los 30º C.

Vencimiento (período de validez)

2 años a partir de la fecha de elaboración

Presentación

Frascos por 100, 250 y 500 ml.